

Jardins Nature admise

Créer un jardin nature admise offre la possibilité de reconstituer un milieu naturel qui soit le plus favorable possible à la biodiversité.

La piéride de la Rave (*Pieris rapae*)

Jean-Marc Michalowski · Thursday, June 30th, 2011

[Juillet 2010] La Piéride de la Rave (*Pieris rapae*) est un des papillons les plus communs et certainement pas menacé. Les adultes sont visibles de mars à octobre, en 3 à 5 générations. Les œufs sont pondus isolément sur la plante hôte, principalement sur les choux et d'autres brassicacées. L'incubation dure une semaine. La chenille est visible d'avril à septembre, sur diverses brassicacées. Elle est entièrement verte, vivant en solitaire, peu visible. Le papillon mesure de 40 à 50 mm d'envergure.

Femelle sur Origan





Femelle entrain de pondre sur un chou



Œufs et chenille



Chenille d'un stade plus avancé



Chenille au dernier stade





This entry was posted on Thursday, June 30th, 2011 at 12:01 am and is filed under [Insectes](#), [Papillons](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can

leave a response, or [trackback](#) from your own site.

This PDF document can't be printed.



Unnecessary printing not only means unnecessary cost of paper and inks, but also avoidable environmental impact on producing and shipping these supplies. Reducing printing can make a small but a significant impact.

Powered by *Unprintable Web* for WordPress - www.greencomputingportal.de