

Jardins Nature admise

Créer un jardin nature admise offre la possibilité de reconstituer un milieu naturel qui soit le plus favorable possible à la biodiversité.

Les floraisons du printemps 2012

Jean-Marc Michalowski · Monday, June 18th, 2012

Le printemps 2012 se termine, je vous propose un rapide aperçu des floraisons de fin mars à fin juin.

Fin mars - début avril, la première à fleurir est une des dernières horticoles encore présente, une Anémone du Japon. Elle est peu voire pas du tout visitée par les premières abeilles. Juste après, un pied de Lamier blanc, présent depuis 2011, fait le bonheur des premiers bourdons.


La première floraison massive a lieu en mai; un géranium (horticole), *Geranium pratense*, s'est largement implanté dans les deux jardinières centrales. Il offre une floraison longue, presque deux mois, en mai principalement. C'est une espèce très fréquentée par les abeilles de la famille des Mégachilles, qui frottent la brosse (poils) de leur abdomen sur les étamines saillantes, pour récolter le pollen, pendant qu'elles recueillent le nectar au fond la corolle à « grands coups de langue ». Une fois les floraisons terminées entièrement, je coupe les tiges et une partie du feuillage afin d'apporter de la lumière à toutes les plantes en sous étage, qui poussent à l'ombre du géranium.

Deux pavots ornementaux fleurissent vers la fin mai (*Papaver orientale* Perrys White et *Papaver orientale* Salmon Glow). Il y a cette année 7 fleurs, un record. Leur floraison est brève (2-3 jours), mais comme ils ne s'ouvrent pas tous en même temps, il y a environ 10 jours de floraison. Très appréciés des bourdons.

Début juin, la Coquelourde commence à fleurir, suivie quelques jours après de la Vipérine. Ces deux plantes ont été introduites pour deux abeilles en particulier. Dans un précédent [billet](#) consacré à une abeille, l'Osmie à crochet, j'ai déjà parlé de la Vipérine, que cette abeille butine exclusivement.

La Coquelourde n'a pas été introduite en tant que plante mellifère ou nectarifère. La Coquelourde (*Lychnis coronaria*) a un feuillage qui forme de belles touffes grises, laineuses et douces au toucher. Au mois de juin, des tiges, hautes d'environ 80 cm, grises et duveteuses elles aussi, émergent et se ramifient vers leur extrémité. Les fleurs rouges tirent sur le magenta. Ce duvet est précisément recherché par des abeilles dites « cotonnières ». J'ai déjà pu observer un [mâle](#) dans mon jardin en juillet 2007 et une [femelle](#) récoltant des fibres sur une Coquelourde dans un jardin liégeois. J'espère donc retrouver ces deux abeilles dans quelques jours / semaines ... si l'été

n'est pas trop maussade 😊

















<

>

This entry was posted on Monday, June 18th, 2012 at 9:59 pm and is filed under [Abeilles solitaires](#), [Avril](#), [Juin](#), [Mai](#), [Mars](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.

This PDF document can't be printed.



Unnecessary printing not only means unnecessary cost of paper and inks, but also avoidable environmental impact on producing and shipping these supplies. Reducing printing can make a small but a significant impact.

Powered by *Unprintable Web* for WordPress - www.greencomputingportal.de