

# Jardins Nature admise

Créer un jardin nature admise offre la possibilité de reconstituer un milieu naturel qui soit le plus favorable possible à la biodiversité.

## Le Noisetier

Jean-Marc Michalowski · Saturday, February 12th, 2011

En forêt et dans les haies, les chatons mâles du Noisetier (appelé aussi Coudrier) libèrent leur pollen dès que le vent se lève et agite les branches.

A la floraison, lors de l'étirement des chatons, les nombreuses étamines laissent échapper les grains de pollen qui seront emportés par le vent. Bien qu'il s'agisse d'une espèce anémogame (reproduction assurée par le pollen véhiculé par le vent), les abeilles sont néanmoins nombreuses à récolter ses grains de pollen lorsque la température est suffisamment élevée pour leur permettre de quitter la ruche à la fin de l'hiver. Le noisetier constitue généralement leur première source de nourriture saisonnière. [Eric Mellin, 2002]



## Chatons (fleurs mâles) du Noisetier

La fleur femelle du Noisetier est minuscule (2 - 3 mm) et se présente sous la forme d'un petit plumet de couleur rouge vif. Elles sont peu nombreuses et rarement observées au premier coup d'œil.



Fleur femelle du Noisetier

This entry was posted on Saturday, February 12th, 2011 at 8:18 pm and is filed under [Calendrier des saisons, Février](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.

### **This PDF document can't be printed.**



Unnecessary printing not only means unnecessary cost of paper and inks, but also avoidable environmental impact on producing and shipping these supplies. Reducing printing can make a small but a significant impact.

Powered by *Unprintable Web* for WordPress - [www.greencomputingportal.de](http://www.greencomputingportal.de)

